

# Активферт-Гино

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ  
ДОБАВКА К ПИЩЕ.

## СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 1 ТАБЛЕТКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА	КОЛИЧЕСТВО	% от РУСП**
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА	400,0 мкг	200***
ИНОЗИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ МИО-ИНОЗИТОЛ И D-ХИРО-ИНОЗИТОЛ*	1127,5 мг	
D-ХИРО-ИНОЗИТОЛ	27,5 мг	

\* Соотношение фракций мио-инозитола и D-хиро-инозитола 40:1  
\*\* Рекомендуемый уровень суточного потребления.  
\*\*\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления

Энергетическая ценность 1 таблетки — 5 ккал / 21 кДж

### ФОРМА ВЫПУСКА:

таблетки массой 3,8 г;  
по 15 быстрорастворимых таблеток  
в пенале.

### СОСТАВ:

регуляторы кислотности (лимонная кислота, натрия гидрокарбонат), инозитол (инозит), декстроза, стабилизатор полиэтиленгликоль, ароматизатор «Апельсин», подсластитель аспартам, D-хиро-инозитол, ароматизатор «Лимон», фолиевая кислота.

Содержит источник фенилаланина.

### УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ЮФЛ», Россия, 143026, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское рп, Можайское шоссе, вл. №165, строение 1.

### АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

БЕЛАРУСЬ, 222219, Минская обл., Смолевичский р-н, д. Скураты, ул. Центральная, 24 Б.

**Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей:** ООО «ЮФЛ», Россия, 143026, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское рп, Можайское шоссе, вл. №165, строение 1.  
**Тел.:** +7(495)7978475 **E-mail:** info@uplabs.ru

Не является лекарством.  
СГР №ВУ:70.06.01.003.E.005675.11.18 от 27.11.2018

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

лицам старше 18 лет в качестве дополнительного источника инозита, D-хиро-инозитола, фолиевой кислоты.

### ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЁМА:

1 месяц, при необходимости приём можно повторить.  
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

взрослым по одной таблетке в день во время или после еды. Таблетку перед употреблением нужно растворить в стакане (200 мл) питьевой воды.



### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

индивидуальная непереносимость компонентов, фенилкетонурия.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С и относительной влажности не выше 70 %.

«№ партии», «Дата изготовления», «Годен до» указаны на упаковке и дне пенала.  
Закрывать плотно крышку пенала.



**Специализированный комплекс Активферт-Гино создан для женщин с целью улучшения функционального состояния репродуктивной системы, восстановления менструального цикла и овуляций. Может использоваться при подготовке к беременности.**

### ЭТАПЫ ЗАЧАТИЯ



СОЗРЕВАНИЕ  
И ВЫХОД ИЗ ЯИЧНИКОВ  
КАЧЕСТВЕННОЙ  
ЯЙЦЕКЛЕТКИ



ПРОХОЖДЕНИЕ  
ЯЙЦЕКЛЕТКИ  
В МАТОЧНУЮ ТРУБУ



ВСТРЕЧА ЯЙЦЕКЛЕТКИ  
СО СПЕРМАТОЗОИДАМИ  
И ОПЛОДОТВОРЕНИЕ



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  
ОПЛОДОТВОРЕННОЙ  
ЯЙЦЕКЛЕТКИ В ПОЛОСТЬ  
МАТКИ, ВНЕДРЕНИЕ  
В ЭНДОМЕТРИЙ  
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ  
РАЗВИТИЕ ЭМБРИОНА

### ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ЖЕНСКОМУ БЕСПЛОДИЮ:

- 1 НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССА ОВУЛЯЦИИ**, КОГДА В ЯИЧНИКАХ НЕ СОЗРЕВАЕТ ЯЙЦЕКЛЕТКА (НАПРИМЕР, СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ (СПКЯ), ЭНДОМЕТРИОЗ И Т.Д.)
- 2 НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ДВИЖЕНИЯ ЯЙЦЕКЛЕТКИ** В ПОЛОСТЬ МАТКИ — НАРУШЕНИЯ НА УРОВНЕ МАТОЧНЫХ ТРУБ (НАПРИМЕР, СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС ИЛИ ЭНДОМЕТРИОЗ)
- 3 НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИКРЕПЛЕНИЯ** ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ЯЙЦЕКЛЕТКИ К ЭНДОМЕТРИУ В МАТКЕ (НАПРИМЕР, ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ)
- 4 ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ ФАКТОР**, КОГДА СЛИЗЬ, ОБРАЗУЮЩАЯСЯ В ШЕЙКЕ МАТКИ, ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ КИСЛОТНОСТЬ, ПЛОТНУЮ И ВЯЗКУЮ КОНСИСТЕНЦИЮ, ЧТО ЗАТРУДНЯЕТ ДВИЖЕНИЕ СПЕРМАТОЗОИДОВ К ЯЙЦЕКЛЕТКЕ

# АктивФерт-Гино

СОВМЕСТНО С СОБЛЮДЕНИЕМ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В ТЕЧЕНИЕ  
**6 МЕНСТРУАЛЬНЫХ  
ЦИКЛОВ** ОБЕСПЕЧИТ:



**НОРМАЛИЗАЦИЮ  
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА  
И ОВУЛЯЦИЙ**



**УМЕНЬШЕНИЕ СИМПТОМОВ  
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО  
СИНДРОМА** (ГОЛОВНЫЕ И  
МЕНСТРУАЛЬНЫЕ БОЛИ,  
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ,  
ОТЁЧНОСТЬ И Т.Д.)



**ПОВЫШЕНИЕ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТКАНЕЙ  
К ИНСУЛИНУ**



**НОРМАЛИЗАЦИЮ  
ВЫРАБОТКИ АНДРОГЕНОВ  
(ТЕСТОСТЕРОНА)**



**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  
ВЛИЯНИЕ  
НА ЛИБИДО**



**УЛУЧШЕНИЕ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ, СНИЖЕНИЕ  
ТРЕВОЖНОСТИ И АППЕТИТА**

## КОМПОНЕНТЫ АктивФерт-Гино

### ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

относится к витаминам группы В, снижает риск развития дефектов нервной трубки плода и других пороков развития, также фолиевая кислота необходима для нормального формирования плаценты. Фолаты предотвращают женскую дисменорею, сопровождающуюся болями внизу живота во время месячных, улучшают женское либидо, служат профилактикой фригидности, снижают риск развития послеродовых депрессий.

### ИНОЗИТ (ФРАКЦИИ МИО-ИНОЗИТОЛ И D-ХИРО-ИНОЗИТОЛ 40:1)

важные компоненты для женского здоровья: улучшают женскую фертильность, восстанавливают чувствительность тканей к инсулину в случаях резистентности, активируют липидный обмен, снижают гиперандрогению при СПКЯ, уменьшают симптомы ПМС, снижают тревожность и аппетит, восстанавливают менструальный цикл и овуляцию, а совместно с фолиевой кислотой повышают частоту наступления беременности.

В нескольких рандомизированных исследованиях было показано, что приём препаратов с D-хиро-инозитолом способствовал статистически достоверному снижению характерных симптомов синдрома поликистозных яичников (СПКЯ): снижались уровни общего и свободного тестостерона, нормализовалось артериальное давление, улучшалась чувствительность к инсулину и увеличивалась частота овуляций.<sup>1,2</sup>

1. Nestler JE, Jakubowicz DJ, Reamer P, Gunn RD, Allan G (1999). «Ovulatory and metabolic effects of D-chiro-inositol in the polycystic ovary syndrome». N. Engl. J. Med. 340 (17): 1314-20. DOI:10.1056/NEJM199904293401703. PMID 10219066.

Нуйслер Д.Е., Якубович Д.Д., Раймер П., Ганн Р.Д., Аллан Г. (1999). «Влияние D-Хиро-инозитола на овуляцию и на обменные процессы при синдроме поликистозных яичников и метаболическом синдроме». Н. Англ. Ж. Мед. 340 (17): 1314-20. НОМЕР DOI:10.1056/NEJM199904293401703. PMID 10219066.

2. Luomo M, Jakubowicz DJ, Baillargeon JP, et al. (2002). «Effects of d-chiro-inositol in lean women with the polycystic ovary syndrome». Endocrine practice 8 (6): 417-23. PMID 15251831. Луорно М.Д., Якубович Д.Д., Байларгеон Д.П. и соавт. (2002). «Эффективность D-Хиро-инозитола у женщин с синдромом поликистозных яичников с нормальной массой тела без метаболических нарушений». Эндокринная практика 8 (6): 417-23. PMID 15251831.



**УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОМПОНЕНТОВ В СОСТАВЕ АКТИФЕРТ-ГИНО, ПОДОБРАННЫЙ С УЧЕТОМ  
НОВЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ОПТИМАЛЬНУЮ ЗАБОТУ О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ!**

## КОГДА НЕОБХОДИМ ПРИЕМ?

### АктивФерт-Гино



При дисменорее (необходимости нормализации менструального цикла), предменструальном синдроме



При планировании беременности



В комплексной терапии женского бесплодия, синдрома поликистозных яичников (СПКЯ)



При подготовке к процедуре ЭКО

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ:



ОТКАЖИТЕСЬ ОТ **ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК** (КУРЕНИЯ И АЛКОГОЛЯ)



ПОСТАРАЙТЕСЬ **НЕ СТАЛКИВАТЬСЯ С ВРЕДНЫМ  
ПРОИЗВОДСТВОМ** (ХИМИЧЕСКИМ И РАДИАЦИОННЫМ)



**ИЗБЕГАЙТЕ СТРЕССОВ** и длительного эмоционального напряжения



ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ, ЕСЛИ ПРИНИМАЕТЕ КАКИЕ-ЛИБО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЯДА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, АППАРАТОВ ИЛИ ПРОЦЕДУР



СТАРАЙТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ БОДРСТВОВАНИЯ И СНА, **ВЫСЫПАЙТЕСЬ**



ОБЯЗАТЕЛЬНО **БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ**. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ УЗКОЙ, СДАВЛИВАЮЩЕЙ ОДЕЖДЫ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВЕНОЗНОГО ЗАСТОЯ В ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА



ЕЖЕДНЕВНО В ТЕЧЕНИЕ **6 МЕНСТРУАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ** ПРИНИМАЙТЕ **АктивФерт-Гино** **ПО 1 ТАБЛЕТКЕ 1 РАЗ В ДЕНЬ**, РАСТВОРИВ ЕЕ В **200 мл** ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО ГОТОВИТЬСЯ К ЗАЧАТИЮ ОБОИМ ПАРТНЕРАМ. ДЛЯ МУЖЧИН СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС **АктивФерт-Андро**, который способствует эффективному сперматогенезу (оптимизирует выработку мужских половых гормонов, повышает либидо, улучшает количество, качество и подвижность сперматозоидов в эякуляте, оптимизирует вязкость спермы). ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ **АктивФерт-гель** за 15 минут до полового акта в период овуляции. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ **ZABEREMENET.COM**